



- Dieta restritiva a glúten
- Dapsona é a primeira linha, sendo iniciada em doses baixas e aumentando gradualmente.
- Sulfassalazina pode ser usado quando a Dapsona não for tolerada

TRATAMENTO

Dermatite Herpetiforme

Como se apresenta

- Lesões papulosas, vesiculobolhosas, extremamente pruriginosas, geralmente simétricas e agrupadas.
- Acomete joelhos, cotovelos, nádegas, costas e ombros.
- O padrão herpetiforme é devido ao agrupamento múltiplo
- Pode ter escoriações, erosões e crostas relacionadas ao prurido intenso

Comorbidades

- Doença celíaca
- Maior predisposição a doenças autoimunes
- Anemias por deficiência de B12, folato ou ferro.

DIAGNÓSTICO

- Biópsia e histopatologia com IFD tendo depósitos granulares de IgA na junção dermoepidérmica.
- Anticorpo antitransglutaminase e antoendomísio

Highlight

- É uma dermatose autoimune, associada à doença celíaca
- Lesões pruriginosas, bolhosas e papulosas
- Afeta adultos jovens e acomete áreas extensoras
- É chamada também de Dermatite de Dunning-Brocq

Olhada rápida

- É uma dermatose autoimune
- Há depósitos de IgA na junção dermoepidérmica na histopatologia
- Dieta sem glúten é essencial para o tratamento
- Pode ser o primeiro sinal clínico da enteropatia celíaca
- Fatores de risco: predisposição genética (HLA-DQ2 e HLA-DQ8), história familiar de doença celíaca, consumo de glúten.