DERMATITE SEBORREICA

Quadro clínico

Caracterizada por períodos de surto e acalmia

Predisposição por áreas seborréicas

Couro cabeludo, região interpeitoral e interescapular, sulco nasogeniano, retroauricular

Lesões maculopapulares, eritematosas ou amareladas, sem brilho, delimitadas e recobertas por escamas de aspecto gorduroso

Forma mais branda e comum é a de couro cabeludo (caspa)

Em bebês geralmente observa-se a crosta láctea

Doença crônica, recidivante, com gravidade que pode variar entre descamação mínima e assintomática até envolvimento generalizado

Epidemiologia

Mais frequente no sexo masculino

Incidência bifásica

Vida adulta (18-40 anos)

Prevalência de aproximadamente 3%

Bebês de 2 semanas a 12 meses

TRATAMENTO

Corticosteroides tópicos isolados ou em combinação aos antifúngicos

COM

Azólicos tópicos em xampu ou cremes

Não é curativa, é para controlar as crises

Patogênese

Não é totalmente esclarecida, mas há envolvimento

Das glândulas sebáceas, fungo *Malassezia*, infecção pelo HIV, Parkinson, entre outras

Diagnóstico

CLÍNICO

Em casos muito intensos ou que não respondem ao tratamento, considerar possibilidade de infecção por HIV

Fatores de risco

- Histórico familiar de dermatite seborreica
- Excesso de sebo
- Presença de respostas inflamatórias anormais ao fungo *Malassezia*
- Doenças neurológicas
- Estresse
- Clima frio e seco

REFERÊNCIA

VILAR, Airá Novello et al. Eczemas. In: AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Azulay Dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Cap. 17. p. 383-430.