É uma condição autolimitada:
dura até 2 semanas

A doença é precipitada por
infecção, em geral pelo vírus da
herpes simples (tipo I ou II)

A doença apresenta 2
formas: eritema multiforme
(EM) maior e menor

A condição é marcada pela
lesão em alvo, a qual pode
ser típica ou atípica

Highlights

As lesões podem
gerar dor e prurido

Quadro clínico

Lesões tem início abrupto e são caracterizadas por pápulas
vermelhas fixas simétricas que evoluem para lesões papulares

lesões surgem em 24h e em até 72h
elas tem se desenvolvido por completo

Nas duas formas de Eritema multiforme
(maior e menor) as lesões são iguais

Em geral a infecção pelo vírus da Herpes
simples precede o surgimento das lesões

Envolvimento mucoso e sistêmico é
característico da forma EM maior

- Nessa forma:
mucosa oral e
ocular, bem como
genitália e lábios
são afetadas
- Há sintomas
sistêmico: febre

ERITEMA MULTIFORME

Diagnóstico

Quadro clínico
+
achados
histológicos

apoptose de
queratinócitos,
progredindo para
degeneração vacuolar
focal. Além disso, também
são visualizados edema
superficial da derme e um
infiltrado perivascular de
leucócitos mononucleares
e linfócitos T com
exocitose para a epiderme

Tratamento

Uso de
antissépticos
nas lesões que
sofrerem
erosão

Uso de
antihistamínicos
orais: para
prurido e
ardência

Uso tópico de
anestésico nas
lesões orais,
bem como
enxaguatórios
antissépticos/
anti-histamínicos

Bologna 3ª edição

Bologna 3ª edição (lesão em alvo típica)

Bologna 3ª edição

REFERÊNCIAS:

1. BOLOGNIA, J.; JORIZZO, J. L.; SCHAFFER, J. V. Dermatologia. [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2015.
2. RUBEM DAVID AZULAY; DAVID RUBEM AZULAY; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. Rio De Janeiro (Rj): Guanabara Koogan, 2008
3. RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. [Artes Médicas]: Grupo A, 2024