PÊNFIGO VULGAR

Como se apresenta

- acomete mucosa oral, palato e gengivas, podendo se apresentar como gengivite descamativa
- Pode se espalhar para região da face e tronco
- Bolhas flácidas que rompidas formam erosões dolorosas sangrantes
- Pode se apresentar como gengivite descamativa

TRATAMENTO

- 1ª escolha: Prednisona, via oral, 1 a 2mg/kg/dia, por 7-10 dias
- Se refratariedade, associar terapia com imunosupressor: azatiopina, via oral, 2mg/kg/dia ou Micofenolato de mofetila, via oral, 35 a 45mg/kg/dia
- Em caso de não melhora significativa usar: Pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia, IV, por 3 dias ou Imunoglubulina 2g, IV, divididos em 5 dias

DIAGNÓSTICO

- Clínico + Histopatológico

olhada rápida

- ·Apresentam produção de autoanticorpos das subclasses IgG1 e IgG4, porém os autoanticorpos patogênicos são da subclasse IgG4.
- -As lesões ulceradas na mucosa oral lembram aftas
- -Pode acometer qualquer idade, porém mais comum entre a 4ª e 6ªdecáda da vida.
- -Alguns recém nascidos com mães com PV apresentam doença clínica e laboratorial, mas que desaparece após alguns meses de nascimento

Highlights

- Pode evoluir para óbito se não for tratada
- Doença autoimune crônica bolhosa
- Forma mais grave de Pênfigo
- Apresenta periodos de remissão e exacerbação

RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. Grupo A, 2024.