

**Penfigoide Cicatricial:** Afeta mucosas, especialmente em idosos, com risco de cegueira e estenose.

**Penfigoide Gestacional:** Dermatose rara em grávidas, com placas urticariformes que evoluem para bolhas tensas. Com boa recuperação pós-parto.

**Penfigoide Bolhoso:** Doença autoimune que causa bolhas tensas em idosos.

**Penfigoide Anti-p200:** Doença rara com autoanticorpos contra a proteína p200, similar ao penfigoide bolhoso. Com psoríase em 50% dos casos.


Causadas por autoanticorpos contra componentes do complexo de adesão da zona da membrana basal.

Doenças incluídas no grupo: penfigoide bolhoso, cicatricial, gestacional, epidermólise bolhosa adquirida e anti-p200

Varia de acordo com a doença mas inclui: corticosteroides e imunossupressores

**Epidermólise Bolhosa Adquirida:** Doença autoimune associada a condições autoimunes, causando bolhas em áreas de atrito.

É um grupo de doenças com antígenos compartilhados. Têm diferenças clínicas, epidemiológicas e histopatológicas difíceis de distinguir. As bolhas são sempre de localização subepidérmica.



afetam principalmente adultos e idosos, com maior prevalência em mulheres, e estão associadas a fatores genéticos, autoimunes e medicamentosos.

tem fatores de risco

Idade avançada, fatores genéticos, doenças autoimunes, condições neurológicas, medicamentos, traumas cutâneos, infecções, neoplasias.

Por imunofluorescência e histologia + clínica



**REFERÊNCIA:**

1. DAVID RUBEM AZULAY; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. [s.l.: s.n.].  
2. BOLOGNIA, J. L. Dermatology. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012.