PRURIGO ESTRÓFULO

Como se apresenta

Início abrupto
As lesões variam em seropápulas, eritemato-edematosas, vesículas, bolhas, escoriações, liquenificação
São lesões esparsas que podem aparecer em tronco, membros e raramente na face
Prurido de intensidade variável
Evolui por surtos e pode ter uma infecção secundária
É mais frequente em crianças atópicas

TRATAMENTO

Prevenção contra picada de inseto
Cuidado com animais domésticos
Anti-histamínico oral
Limpeza das lesões e aplicação de corticoide tópico (pouco efeito)
Soluções a base de colamina, óxido de zinco, camomila e mentol para aliviar o prurido
Antibiótico tópico e/ou sistêmico para infecção secundária

DIAGNÓSTICO

Anamnese e exame das lesões

olhada rápida

Conhecido como urticária infantil
lesões papulo-vesiculosas
Pruriginosas
Nos primeiros anos de vida
Surtos (evolui quando exposta ao antígeno)
Hipersensibilidade a diversos antígenos

Highlight

Hipersensibilidade a picada de inseto
Reservatórios : cães e gatos
Pacientes hiperreativos as lesões são mais frequentes e mais exuberantes
Seropáoula de Tomazoli é lesão característica
Pode ser encontrado em áreas expostas
Lesão aguda, polimórfica (ato de coçar)

RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. Grupo A, 2024.