é classificada em aguda ou crônica, com lesões específicas ou não específicas, com sobreposição entre as formas

O eritema nodoso é uma manifestação inespecífica, com bom prognóstico na fase aguda, associada a adenopatia, uveíte e sintomas sistêmicos

20 a 35% dos pacientes com doença sistêmica apresentam lesões cutâneas, como pápulas e placas eritematoacastanhadas

Lesões cutâneas afetam principalmente a face, tronco superior e extremidades, podendo ocorrer independentemente da doença sistêmica

pode afetar vários órgãos, mas frequentemente é assintomática

As formas cutâneas incluem anular, papulosa, lúpus pérnio, angiolupoide, e sarcoidose sobre cicatrizes; a forma subcutânea apresenta nódulos indolores nas extremidades, e a forma sistêmica pode causar adenomegalia e comprometimento pulmonar

APRESENTAÇÕES CLÍNICAS

Depende da extensão e do órgão acometido: Corticoides Antimaláricos

TRATAMENTO

SARCOIDOSE

DIAGNÓSTICO

exame histopatológico (granuloma sarcóidico). teste de Kveim

CONCEITO

EPIDEMIOLOGIA

Doença granulomatosa sistêmica de causa desconhecida. Acomete quase todos os órgãos e está associada a alterações imunológicas. Caracteriza-se pela presença de granulomas sarcóidicos.

tem uma distribuição bimodal (25-35 anos e 45-65 ano)

tem fatores de risco

É uma doença rara, com predisposição genética, tem maior incidência em negros nos EUA

- Idade (adultos jovens)
- Sexo feminino
- Predisposição genética
- Ascendência africana
- Exposição ambiental
- Histórico familiar

Diascopia
Dosagem do cálcio (principalmente urinário) e da lisozima.

REFERÊNCIA:

1. DAVID RUBEM AZULAY; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. [s.l.: s.n.].
2. BOLOGNIA, J. L. Dermatology. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012.