



VITILIGO

Highlights

- Caracterizado por áreas de pele descoloridas devido à perda gradual de melanócitos.
- Idade média do surgimento da lesão: 20 anos
- Diagnóstico é clínico

Diagnóstico

Clínica + exame físico
 ↓
 lâmpada de Wood: destaca as regiões acrómicas em relação à pele saudável



Vitiligo à luz de Wood: foto Azulay 8ª EDIÇÃO

tto

- Coticóide
- Inibidores de calcineurina tópicos
- Análogos da vitamina D3
- Psorásol
- Despigmentação

- Depende:
- Extensão,
 - Localização
 - Atividade da doença
 - Idade,
 - Fototipo
 - Motivação do paciente.

Clínica

- Manchas ou máculas acrómicas
- Lesão circundada por pele normal e de crescimento centrífugo
- Predileção por: face, dorso das mãos, região sacral, inguinal e anogenital.
- Leucotriquia corporal: em 10 - 60% dos pacientes
- Fenômeno de Koebner em 30 - 60% dos pacientes

Classificação

- Localizado
- Generalizado
- Universal



REFERÊNCIA:
 1. BOLOGNIA, J.; JORIZZO, J. L.; SCHAFFER, J. V. Dermatologia. [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2015.
 2. RUBEM DAVID AZULAY; DAVID RUBEM AZULAY; AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. Rio De Janeiro (Rj): Guanabara Koogan, 2008
 RIVITTI, Evandro A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. [Artes Médicas]: Grupo A, 2024.